

COMUNICAT PRIVIND FUNCȚIONAREA CENTRELOR DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI

Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați a fost înființat **CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19**.

CENTRU VACCINARE	ADRESA	L	M	M	J	V	S	D
Directia de Sănătate Publică Galați	Str. Traian, nr. 19, Galați	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	-	-

Pentru programare la vaccinare aveți la dispoziție următoarele date de contact:

Telefon; 0236 / 460 274 interior 4.

E-mail: raportaregl@gmail.com

dspgl@dsp-galati.ro

De asemenea, vaccinarea poate fi efectuată și la cabinetele medicilor de familie, după o prealabilă programare și solicitare a vaccinurilor de la DSP Galați.

Ce este Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 și pentru ce se utilizează

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 este un vaccin utilizat pentru prevenirea bolii COVID-19, afecțiunea cauzată de SARS-CoV-2. Se administrează la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste.

Vaccinul determină sistemul imunitar (sistemul natural de apărare al organismului) să producă anticorpi și celule sanguine, care acționează împotriva virusului, oferind astfel protecție împotriva bolii COVID-19.

Întrucât Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 nu conține virusul pentru a produce imunitatea, nu vă poate transmite boala COVID-19.

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 **nu trebuie administrat:**

- dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să vi se administreze vaccinul, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă:

- ați avut vreodată o reacție alergică severă sau probleme la respirație după orice alt vaccin injectabil sau după ce vi s-a administrat Comirnaty în trecut.
- vă simțiți neliniștit în legătură cu procesul de vaccinare sau vi s-a întâmplat vreodată să leșinați după o injecție efectuată cu acul.
- aveți o boală severă sau o infecție cu febră mare. Cu toate acestea, vi se poate administra vaccinul dacă aveți febră scăzută sau o infecție ușoară la nivelul căilor respiratorii superioare, de exemplu o răceală.
- aveți o problemă legată de sângerare, vă apar vânătăi cu ușurință sau utilizați un medicament care previne cheagurile de sânge.
- aveți un sistem imunitar slăbit din cauza unei boli, cum este infecția cu HIV, sau din cauza unui medicament care vă afectează sistemul imunitar, cum este un corticosteroid.

Vaccinarea cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 (15/15 micrograme)/doză dispersie injectabilă:

- se administrează la adulți și copii cu vârsta de cel puțin 12 ani;
- este indicat doar persoanelor cărora li s-a administrat anterior cel puțin 1 **schemă primară completă*** de vaccinare împotriva COVID-19;
- poate fi administrat la cel puțin 3 luni după cea mai recentă doză de vaccin împotriva COVID-19;
- poate fi administrat concomitent sau la orice distanță de timp cu un alt produs din Programul Național de Vaccinare (ex. Vaccinarea antigripală sau anti-HPV);

*Schema primară completă:

- 1 doză de vaccin Janssen/Johnson&Johnson;
- 2 doze de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca;
- 1 doză de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca+ 1 doză Comirnaty Pfizer BioNTech;
- 1 doză de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca+ 1 doză de Spikevax/Moderna;
- 2 doze de Comirnaty PfizerBioNTech (de tip adult sau pediatric);
- 2 doze de vaccin Spikevax/Moderna;

Vaccinul se administrează intramuscular, preferabil în regiunea superioară a brațului, la nivelul mușchiului deltoid.

Expunerea recentă la SARS-COV-2 nu este o contraindicație sau precauție pentru vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5. Persoanele care au trecut prin infecția cu SARS-COV-2 pot fi vaccinate după vindecare.

Persoana care se prezintă la vaccinare va avea asupra sa buletinul/carta de identitate și dovada vaccinării cu schema completă (în cazul persoanelor vaccinate în țări membre UE și non-UE).

Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de părinte/ tutore legal care va avea asupra sa cartea de identitate/dovada tutore și certificatul de naștere al copilului/carte de identitate, după caz.

Direcția de Sănătate Publică Galați

<p>Este obligatorie vaccinarea?</p> <p>Nu, vaccinarea împotriva COVID-19 este opțională. Se face la cerere, pe baza consimțământului informat și este gratuită.</p>	<p>De ce să ne vaccinăm?</p> <p>Vaccinul ne oferă protecție împotriva complicațiilor, formelor grave ale bolii și posibil pentru reducerea transmiterii.</p>	<p>Prin ce diferă actualul vaccin de varianta anterioară?</p> <p>Acest nou vaccin este adaptat pentru tulpinile de virus aflate acum în circulație.</p>	<p>Există categorii prioritare la vaccinare?</p> <p>Nu este cazul, vaccinarea funcționează după principiul „primul venit, primul servit”.</p>
<p>Cine se poate vaccina?</p> <p>Toate persoanele cu vârsta de peste 12 ani, cărora li s-a administrat schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 cu cel puțin 3 luni înainte.</p>	<p></p> <p>INFORMAȚII ESENȚIALE PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 CU NOUL VACCIN</p> <p>(COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 - Pfizer BioNTech)</p>	<p>Există reacții adverse la vaccinare?</p> <p>Sunt posibile, ca și în cazul altor vaccinuri. Cele mai frecvente sunt durere la locul injectării, oboseală, cefalee, frison.</p>	<p>Există contraindicații la vaccinare?</p> <p>Da, numai dacă persoana este alergică la substanța activă sau orice alt ingredient al vaccinului.</p>
<p>Unde ne putem vaccina?</p> <p>Imediat, în centrele de vaccinare deschise în unitățile medicale (conform listei);</p> <p><i>sau</i></p> <p>Prin programare, la toți medicii de familie care au contract cu casele de sănătate; (medicii de familie trebuie să solicite noul vaccin de la DSP local)</p>	<p>Dacă vreau să mă vaccinez pentru prima dată împotriva COVID-19, pot utiliza acest vaccin?</p> <p>Nu, acest vaccin este adresat doar celor care fac o doză de rapel („booster”). Pentru a beneficia de acest vaccin trebuie să faceți, inițial, schema primară.</p>	<p>Se poate administra concomitent cu alte vaccinuri?</p> <p>Vaccinul Comirnaty Original/ Omicron BA.4-5 se poate administra concomitent sau la orice interval de timp cu alt vaccin din Programul Național de Vaccinare, inclusiv cu vaccinul gripal.</p>	<p>Există categorii de persoane pentru care vaccinarea este recomandată în mod special?</p> <p>Da, la persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici, cei care sunt la risc de a face forme severe de îmbolnăvire.</p>